

ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО

ЛІЩИНА БЕРЕЗОКОРА (*CORYLUS BETULACORTEX* M.)

міжродова гібридна форма (7-03) ліщини ведмежої і берези пониклої

(*Corylus colurna* L. × *Betula pendula* L.)

Нині підщепою для **фундука звичайного** (*C. avellana* L.) слугує **фундук ведмежий** (*C. colurna* L.) та інші деревоподібні форми роду *Corylus* L., які розмножуються **насіннями, живцями, *in vitro***. Ці сильнорослі підщепи відзначаються низькою технологічністю в розсаднику (повільний ріст, проблеми з сумісністю, сильнорослість кущо-дерева).

Ліщина Березокора (середньоросла підщепа) має суттєві анатомо-морфологічні і фізіологічні відмінності від ведмежої. Розмножується як традиційними методами, так і вертикальними відсадками. Березокора дозволяє отримувати високий вихід кронуваних саджанців (більше 90%) за 2-3 роки, суттєво зменшити габітусні параметри крони кущо-дерева в саду і збільшити щільність дерев та їх продуктивність.


ПЕРЕВАГИ ЩЕПЛЕНОЇ КУЛЬТУРИ:

- експлуатація промислового саду близько 60-80 років;
- енергозберігаюча і екологічна спрямованість технології;
- сорт, підщепа, форма крони і система обрізування забезпечують високу продуктивність і якість плодів;
- сад (конструкція) відзначається високою адаптивністю до конкретних ґрунтово-кліматичних умов;
- конструкція саду дозволяє оптимізувати енергетичні затрати і знизити кількість агротехнічних компонентів, в т.ч. ручної праці; підвищити урожайність, якість і товарність продукції в порівнянні з існуючою кореневласною технологією.

Співпраця та консультації:
МИКОЛА МАТВІЄНКО, канд. с.-г. наук,
лауреат премії ім. Л.П. Симиренка

e-mail: infosadok@gmail.com

тел: + 380 67-296-40-11



Сіянци, окулянти, 1-річки



Маточник, гориз. відсадки



Сад, Караманівський 3-річка
на С.б.М, штаб 110см



Багряна куля, 2-річка



1-річні вертикальні відсадки

